



# CITISINA (Todacitan®)

Tractament oral.  
Disponible en envasos de 100 comprimits d'1,5 mg.

## Dosi i durada habitual

**Durada del tractament:** 25 dies = un envàs de citisina (100 comprimits)

### Pauta decreixent:

Dia de tractament	Dosi /dia	Comprimits/dia
Del 1r al 3r dia	1 comprimit cada 2 hores	6 comprimits
Del 4t al 12è dia	1 comprimit cada 2,5 hores	5 comprimits
Del 13è al 16è dia	1 comprimit cada 3 hores	4 comprimits
Del 17è al 20è dia	1 comprimit cada 5 hores	3 comprimits
Del 21è al 25è dia	1-2 comprimits al dia	Fins a 2 comprimits

## Instruccions

S'ha de deixar de fumar com a màxim abans del 5è dia de tractament.  
En el cas que es continuï fumant o que s'utilitzi algun producte amb nicotina, podrien agreujar-se els efectes adversos.  
Cal empassar-se el comprimit amb un got d'aigua.

## Efectes adversos

Bona tolerància. La major part dels efectes adversos es produeixen a l'inici del tractament i després desapareixen. Alguns d'aquests efectes poden ser a conseqüència del fet de deixar de fumar. Els més freqüents són gastrointestinals d'intensitat lleu o moderada: nàusees, vòmits, dolor abdominal, cremor d'estómac, diarrea o restrenyiment. Altres efectes possibles són: alteració del gust, sequedat de boca, augment de la gana, augment de pes, mareig, canvis d'humor, ansietat, trastorns del son, cefalea, taquicàrdia, hipertensió, erupció cutània, miàlgies, fatiga.

## Contraindicacions

Hipersensibilitat al principi actiu o a qualsevol dels seus excipients.  
Angina inestable, antecedents d'infart de miocardi recent, arrítmies amb rellevància clínica, antecedent recent d'accident cerebrovascular.  
Està contraindicat durant l'embaràs o la lactància. Es desconeix si pot reduir l'eficàcia dels anticonceptius hormonals.  
Per manca d'estudis, no és recomanable ni en menors de 18 anys ni en majors de 65 anys; tampoc en persones amb insuficiència renal o hepàtica.

## Precaucions

Per manca d'estudis, en general, cal parar atenció a les persones amb cardiopatia isquèmica, insuficiència cardíaca, hipertensió arterial, feocromocitoma, arterioesclerosi i altres vasculopaties perifèriques, úlcera gàstrica i duodenal, malaltia per reflux gastroesofàgic, hipertiroidisme, diabetis i esquizofrènia.  
Heu d'aconsellar als pacients que informin de qualsevol circumstància inusual: canvis d'humor, depressió, alteracions del comportament i idees suïcides.  
Cal parar especial atenció als pacients amb antecedents de malaltia psiquiàtrica.

## Interaccions

Té una mínima metabolització hepàtica. És un fàrmac d'eliminació renal.  
No s'ha de prendre juntament amb fàrmacs antituberculosos.  
Fins ara no s'han descrit interaccions clínicament significatives amb altres fàrmacs.  
\*Per a més detalls sobre possibles interaccions i altres contraindicacions, podeu consultar la fitxa tècnica del Todacitan.