



Instruccions d'ús dels comprimits de citisina (*Todacitan*[®])


COM FUNCIONA EL TRACTAMENT AMB CITISINA?

La citisina **actua de dues maneres**: d'una banda, substitueix l'efecte de la nicotina en el cervell i **alleugereix els símptomes d'abstinència** i d'altra banda, **disminueix el plaer associat al consum de tabac**.

DOSIFICACIÓ DEL FÀRMAC

- S'ha de **deixar de fumar** com a màxim **abans del 5è dia de tractament**. En el cas que es continuï fumant o que s'utilitzi algun producte amb nicotina, podrien agreujar-se els efectes adversos. El fàrmac sempre ha de ser prescrit per un professional sanitari.
- Durada del tractament: 25 dies** = un envàs de citisina (100 comprimits)
- La **pauta** del fàrmac és **decreixent**:

Dia de tractament	Dosi/dia	Comprimits/dia
Del 1r al 3r dia	1 comprimit cada 2 hores	6 comprimits
Del 4t al 12è dia	1 comprimit cada 2,5 hores	5 comprimits
Del 13è al 16è dia	1 comprimit cada 3 hores	4 comprimits
Del 17è al 20è dia	1 comprimit cada 5 hores	3 comprimits
Del 21è al 25è dia	1-2 comprimits al dia	Fins a 2 comprimits



CITISINA



| Instruccions d'ús dels comprimits de citisina (*Todacitan*®)

| **COM PRENDRE EL FÀRMAC**

- El comprimit s'ha de prendre amb un got d'aigua.

| **POSSIBLES EFECTES ADVERSOS**

- La major part dels **efectes adversos són lleus**, es produeixen a l'inici del tractament i després desapareixen.
- Alguns dels **possibles efectes adversos més freqüents** són:
 - Nàusees o vòmits
 - Dolor abdominal i/o diarrea
 - Restrenyiment
 - Sequedat de boca
 - Mal de cap
 - Trastorn de la son
- **Consulteu un professional sanitari si persisteix o augmenta la intensitat de qualsevol d'aquests símptomes per valorar una reducció de la dosi.**

CITISINA