



Instruccions d'ús dels comprimits de bupropió (*Zyntabac*[®])

COM FUNCIONA EL TRACTAMENT AMB BUPROPIÓ?

El bupropió és un **fàrmac antidepressiu** que actua **disminuint el desig de fumar** i la **síndrome d'abstinència**.



DOSIFICACIÓ DEL FÀRMAC

- Es comença a prendre el fàrmac **una o dues setmanes abans de la data triada** per deixar de fumar. El fàrmac sempre ha de ser prescrit per un professional.
- La dosi de fàrmac és **progressiva**. Durant la **primera setmana** es segueix la pauta:
 - Del **primer al sisè dia**: 1 mg al matí.
 - Des del **setè dia**: 1 mg al matí i a la tarda.
- El tractament dura **entre 8 i 12 setmanes**.



BUPROPIÓ



| Instruccions d'ús dels comprimits de bupropió (*Zyntabac*®)

| **COM PRENDRE EL FÀRMAC**

- Prendre el comprimit sencer.
- **Separeu** les dues dosis com a **mínim 8 hores**.
- Preneu la dosi de la tarda **abans de les 18 hores** per minimitzar el risc d'insomni.
- Preneu el fàrmac **sempre a la mateixa hora**, si és possible.

| **POSSIBLES EFECTES ADVERSOS**

- Els efectes adversos més freqüents són lleus.
- Alguns dels possibles **símtomes** són:
 - Afectació del sentit del gust
 - Mal de cap
 - Insomni
 - Sequedat de boca
- **Consulteu un professional sanitari si es presenta qualsevol d'aquests símptomes per valorar una reducció de la dosi.**

BUPROPIÓ