


MORTALITAT PER TABAQUISME

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) 2017: El tabac mata cada any a més de 7 milions de persones, de les quals més de 6 milions són consumidors del producte i al voltant de 890 000 són no fumadors exposats al fum ambiental de tabac. El consum de tabac factor de risc de 6 de les 10 causes principals de mortalitat al mon. Dades del 2015. [Global Health Observatory \(GHO\)](#). Les causes de mort és un dels indicadors més importants per avaluar l'eficàcia dels sistemes de salut dels països. Les estadístiques sobre les causes de mort ajuden a les autoritats sanitàries a orientar les activitats futures en matèria de salut pública, per posar en marxa programes potents per fomentar estils de vida saludables i prevenir malalties i per augmentar les despeses en les esferes amb major mortalitat.



L'informe Espanyol té en compte el tabaquisme com a causa de mortalitat, comentant les morts calculades atribuïbles al tabac i calculant també específicament com a un indicador que només té en compte les defuncions per càncer de pulmó, doncs el 90% es deu al tabaquisme. [Informe de Mortalitat atribuïble al consum de tabac En Espanya, entre 2000-2014](#). Al 2014 són 15.227 a Catalunya les morts atribuïbles al consum de tabac, no obstant això, a Catalunya, a l'informe de mortalitat no inclou el tabaquisme, ja que només té en compte les causes directes de mort.

Tal com diu l'informe de la OMS sobre la epidèmia mundial de tabaquisme, 2008. [Pla de mesures MPOWER](#): El tabac és la causa singular de mortalitat més previsible en el mon actual.

S'ha de continuar investigant sobre les associacions i càrrega per causes de defuncions del consum de tabac i s'han de tenir en compte en els informes de causes de mortalitat.