



# CITISINA

## Tractament oral: citisina/citisiniclina Comprimits d'1,5 mg

### Dosi i durada habitual

**Durada del tractament:** 25 dies = un envàs de citisina (100 comprimits)

#### Pauta decreixent:

Dia de tractament	Dosi /dia	Comprimits/dia
Del 1r al 3r dia	1 comprimit cada 2 hores	6 comprimits
Del 4t al 12è dia	1 comprimit cada 2,5 hores	5 comprimits
Del 13è al 16è dia	1 comprimit cada 3 hores	4 comprimits
Del 17è al 20è dia	1 comprimit cada 5 hores	3 comprimits
Del 21è al 25è dia	1-2 comprimits al dia	Fins a 2 comprimits

### Instruccions

S'ha de deixar de fumar com a màxim abans del 5è dia de tractament. En el cas que es continuï fumant o que s'utilitzi algun producte amb nicotina, podrien agreujar-se els efectes adversos. El comprimit s'ha d'empassar amb aigua.

### Efectes adversos

Bona tolerància. La major part dels efectes adversos es produeixen a l'inici del tractament i després desapareixen.

Els efectes adversos més freqüents són gastrointestinals d'intensitat lleu o moderada, alteració del gust, boca seca, augment de la gana, augment de pes, mareig, irritabilitat, canvis d'humor, ansietat, trastorns del son, cefalea.

### Contraindicacions

Hipersensibilitat al principi actiu o a qualsevol dels seus excipients.

Angina inestable, antecedents d'infart de miocardi recent (4 setmanes), arrítmies amb rellevància clínica, antecedent recent d'accident cerebrovascular.

Està contraindicat durant l'embaràs o la lactància.

### Precaucions

Per manca d'estudis, en general, no és recomanable en menors de 18 anys ni en majors de 65 anys i cal parar atenció en les persones amb cardiopatia isquèmica, insuficiència cardíaca, hipertensió arterial, feocromocitoma, arterioesclerosi i altres vasculopaties perifèriques, úlcera gàstrica i duodenal, malaltia per reflux gastroesofàgic, hipertiroïdisme, diabetis, esquizofrènia, insuficiència renal o hepàtica.

### Interaccions

Té una mínima metabolització hepàtica. És un fàrmac d'eliminació renal.

No s'ha de prendre juntament amb fàrmacs antituberculosos.

Fins ara no s'han descrit interaccions clínicament significatives amb altres fàrmacs.

\*Per a més detalls sobre possibles interaccions i altres contraindicacions, podeu consultar la fitxa tècnica del fàrmac.